Instituto Latino Americano de Sepse

Campanha de Sobrevivência a Sepse
CHECK-LIST

Data/hora do diagnóstico médico de sepse ou choque séptico: ____/____/____

Itens do pacote de 3 e 6 horas	**Data/hora**
( ) Colher lactato arterial sérico	____/____/____ às ____:___
( ) Colher duas hemoculturas	____/____/____ às ____:___
( ) Administrar antimicrobiano intravenoso adequado	____/____/____ às ____:___

( ) Se lactato alterado (≥ 2 x valor normal), administrar 30 mL/kg de cristaloides

( ) Se hipotensão, administrar 30 mL/kg de cristaloides

( ) Se persistência de hipotensão, iniciar noradrenalina
Início do vasopressor: ___/___/___às ___:___

( ) Se lactato alterado (≥ 2 x valor normal), coletar nova amostra de lactato arterial após reposição volêmica ___/___/___ às ____:____

( ) Se hipotensão e/ou hiperlactatemia, avaliar o *status* volêmico e perfusão nas primeiras 6 horas

Considere avaliação se houver registro médico sobre:
( ) Mensuração de PVC
( ) Variação de pressão de pulso
( ) Variação de distensibilidade de cava
( ) Elevação passiva de membros inferiores
( ) Outras formas de avaliação de responsividade a volume
( ) Melhora do nível de consciência
( ) Melhora da diurese
( ) Mensuração de $SvcO_2$
( ) Melhora do tempo de enchimento capilar
( ) Melhora da intensidade de livedo

Registro no prontuário dessa avaliação: ___/___/_____ às ___:___

PARABÉNS!!
O atendimento ao paciente séptico é multidisciplinar e todos, TODOS devem estar envolvidos para que nosso objetivo seja atingido!

Revisado em: novembro de 2016